



Dr. Ibrahim Al Attrach

Kinderarztpraxis

Kornmarkt 23, 45127 Essen


Tel: 0201-612 09 619

info@attrach.de

www.praxis-attrach.de


الخصية الهاجرة – عدم نزول الخصية

- تتواجد الخصيتان داخل كيس جلدي يسمى "كيس الصفن". خلال فترة الحمل تتواجد الخصيتان في الجزء السفلي من بطن الجنين. قبل الولادة ، تغير الخصيتان موقعهما إلى الأسفل لتستقر في كيس الصفن.
- إذا لم يحدث هذا النزول ، تبقى إحدى الخصيتان أو كليهما في البطن أو في ثنية المغبن (الثنية بين البطن وأعلى الفخذ) أو عند التقاء هذه الثنية مع كيس الصفن (أي في الزاوية العلوية لكيس الصفن). هذه الحالة لها عدة تسميات كالخصية المعلقة أو الهاجرة أو المختفية ... إلخ ..
- في بعض الأحيان ، لا تتشكل إحدى الخصيتين أو كليهما بشكل طبيعي بسبب مشكلة تحدث قبل ولادة الطفل و يكون لدى الطفل خصية وحيدة.



كيف يمكن تشخيص الخصية الهاجرة (عدم نزول الخصيتين)؟

- في معظم الأحيان ، يكتشف الطبيب المشكلة أثناء فحص الطفل الروتيني بعد الولادة مباشرة ، وهذا الأمر هو أكثر شيوعًا عند الأطفال الخدج (الذين يولدون في وقت أبكر من تاريخ الولادة المتوقع).
- عادة ما يكتفى بالمراقبة حتى يبلغ الطفل عمر 6 أشهر فإذا لم يمكن جس الخصية في الصفن في هذا العمر يجري عادة تصوير الصفن بالأمواج فوق الصوتية (السونار Sonografie)





Dr. Ibrahim Al Attrach

Kinderarztpraxis

Kornmarkt 23, 45127 Essen

Tel: 0201-612 09 619

info@attrach.de

www.praxis-attrach.de

كيف يتم علاج الخصية الهاجرة (المعلقة)؟

- إذا تم كشف الحالة بعد الولادة مباشرة ، لا حاجة للعلاج المباشر ، بل يكتفى بالانتظار والمراقبة ، لأن الخصيتين تنتقلان إلى كيس الصفن في غضون أشهر قليلة بعد الولادة في أغلب الحالات.
- إذا لم يحدث ذلك ، فعادةً ما يكون العلاج بإجراء عملية جراحية لإنزال الخصية أو الخصيتين إلى كيس الصفن.
- ينصح عادة بإجراء الجراحة في عمر ما بين 12 و 18 شهرا ، وتأخير العملية الجراحية لما بعد عمر السنتين يؤدي غالبا لتضرر الخصية .

الخصية المتحركة

وتعرف أيضا بإسم "الخصية النطاطة" (Pendelhoden) (بالإنكليزية Retractable Testis) وذلك لأنها تغير مكانها باستمرار ، فتتواجد أحيانا في موضعها الطبيعي في أسفل كيس الصفن ، وأحيانا أخرى تصعد لمنطقة المغبن. إذا كانت الخصية تبقى معظم الوقت في كيس الصفن فلا تحتاج إلى علاج جراحي ، وإنما يكتفى بالمراقبة الدورية لها.

مضاعفات الخصية الهاجرة

- التأخر في علاج الخصية الهاجرة (المعلقة) في الطفولة يمكن أن يؤثر سلبيا على تطور نسيج الخصية ووظيفتها مما قد يسبب المضاعفات التالية مستقبلا:
 - نقص الخصوبة أو العقم: يمكن أن تحدث هذه المشكلة عند الرجال الذين كان لديهم خصية هاجرة ثنائية الجانب و تأخر علاجها.
 - سرطان الخصية: سرطان الخصيتين نادر الحدوث عموما ، وقد يحدث في الخصيتين الطبيعتين سابقا ، لكن نسبة الإصابة تكون أعلى قليلا إذا كان الرجل مصابا بالخصية الهاجرة في طفولته. لهذا السبب ينصح بإجراء الفحص الدوري للخصيتين مستقبلا.